

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

HYDROPE.

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
HYDROPE:

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI,

D. GEORGII BAIRD, SS.T.P.
ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu, et
Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ Decreto;

PRO

GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

RICHARDUS HEELIS,
ANGLUS,

SOCIET. REG. MED. EDIN. SOD. EXTR.

AD DIEM 24. JUNII, HORA LOCOQUE SOLITIS.

EDINBURGI:

EXCUDERANT ADAMUS NEILL ET SOCII.

=====
M DCC XCVII.

350337

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE
HYDROPE:

1844

ANNO DOMINI 1844

EX AUCTORITATE REVERENDI A-MODUM VIRI

D. GEORGI BAIRD, S.S.T.P.

Bolfter'd with down, amid a thousand wants,
Pale DROPSY rears his bloated head, and pants :
" Quench me, ye cool pellucid rills !" he cries,
Wets his parch'd tongue, and rolls his hollow eyes.
So bends tormented Tantalus to drink,
While from his lips the refluent waters shrink ;
Again the rising stream his bosom laves,
And thirst consumes him 'midst circumfluent waves.

DARWIN.

MISSIO IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

INTE ET LEGITIME CONSPICUUS

RECTORUM EXAMINI SUBIICIT

RICHARDUS NELLIS

ANGLOS

SOCIETATE MED. EDINBURG.

AD DIEM 14. JUNII, HORA 10.00. AM.



EDINBURGI:

RECEPTANT ADAMUS NELLIS ET SOCIUS

M. DC. XLIV.

AVUNCULO SUO,

ET AMICO DILECTISSIMO,

CHRISTOPHERO MACHELL,

LEGIONIS TRIBUNO;

VIRO

VIRTUTE OMNIGENA

ORNATO;

PROPTER MAXIMA BENEFICIA,

INSIGNEMQUE AMOREM,

QUIBUS SE NUNQUAM NON PROSECUTUS EST;

AVINCULO SUO

ET AMICO DILECTISSIMO

CHRISTOPHERO MACHELL

LEGIONIS TRIBUNO

VIRO

VIRTUTE OMNIGENA

ORNATO

PROPTER MAXIMA BENEFICIA

INSIGNEMQUE AMOREM

QUIBUS SE NUMQUAM NON PROSECUTUS EST

ITIDEM,

VIRO SPECTATISSIMO

HENRICO AINSLIE, M.D.

NOSOCOMII SANCTI THOMÆ LONDINI

MEDICO;

OB EXIMIA AMICITIÆ MUNERA,

IN SE, SUOSQUE,

ITERUM ITERUMQUE COLLATA;

HASCE STUDIORUM PRIMITIAS,

ANIMI QUAM GRATISSIMI

TESTIMONIUM,

CONSECRAT

A U C T O R.

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS

Ars enim ex rebus penitus perspectis, planèque cognitis, atque ab opinionis arbitrio sejunctis præceptionibus constat; datque rationes certas, quæ habent ordinem, et quasdam errare in faciendo non patientes vias: at hypothefibus quibus hodie tantopere delectamur, quid incertius? An eæ quicquam aliud habent ut plurimum nisi meras conjecturas, quibus ex fimilitudine in varias partes, nonnunquam etiam contrarias trahimur? Non in humani profectò ingenii acumine fita est ars præstantissima, quam diligens, accurata, et sagax notatio naturæ, et animadversio peperit; sed potius variis cujusque ætatis doctorum laboribus coacervata sapientia dicenda est, hominumque multorum mens in uno quasi collecta.

BAGLIVI.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

HYDROPE.

M IHI tractandus est *Hydrops*, dirus et periculofus ut fuit *Hydra*; nullis vinculis frequentiffimè coërcendus, multos miferos armis luridis coërcens, denique pallidâ morte. Multi, haud immeritò quidem, inter opprobria medicinæ hunc morbum collocarunt, et dudum dixit ARETÆUS, “ Ab ipfo
“ pauci liberantur, idque felicitate, ac deo-
“ rum potiùs quàm artis auxilio.” Licèt

A

enim

enim ex morbis variis per notitiam systematis vaforum absorbentium explicatis, nullius fortassè magis quàm hydropis natura patefacta fuit; dolendum est tamen, omnia remedia et a Medicis antiquioribus et recentioribus in hoc morbo maximè laudata, vana omninò et inutilia sæpiùs esse folere.

DEFINITIO HYDROPS GENERALIS.

“ Uberior ferofi humoris in aliquod corporis cavum effusio, atque in eodem congestio et stagnatio, propriè *hydrops* appellatur*.”

Multa hydropis genera a Medicis recensentur: Pro varia tamen partium ratione, quas ferosa occupat colluvies, diversa nomina diversa hydropis genera designantia adhibentur, et varia eorum symptomata ex eadem varietate præcipuè oriuntur: ea omnia verò, eadem

* BURZERII Instit. Medicinæ Pract. vol. iv. p. 153.

dem causas generales agnoscunt, similiaque remedia postulant. De omnibus hisce generibus, præsertim de *hydropibus saccatis*, et *hydatitibus* dictis, opusculi hujusce limites arcti differere nos prohibent; tria igitur excerpimus, *anasarcam* nempe, *hydrothoracem*, et *ascitem*, quæ mox paucis verbis singulatim describere aggredimur.

Hydropis genera diversa, modò seorsum, modò verò conjunctim, adoriuntur. Nullo alio morbo præeunte, subitò nonnunquam sese prodit hydrops, graduque citissimo progreditur. Effusio ea, cui potus frigidus, corpore calente, avidè exhaustus, causam dat, hujusmodi exemplum præbet. Multò autem frequentius, sensim et insidiosè crescit malum, et plerumque aliis morbis, tum *chronicis*, tum *acutis* diu protractis, quales sunt febres intermittentes, dysenteria, hæmorrhagiæ, hepatis pulmonisque morbi, plurimique alii, supervenit.

DE GENERIBUS SINGULATIM.

DE ANASARCA.

Anasarca a clariff. CULLENO ita definitur:

“ Corporis totius vel partis ejus intumescen-
 “ tia mollis, inelastica.”

Nonnulli *leucophlegmatiam* ab *anasarca* di-
 stinguunt, ita ARETÆUS: ‘ Si omne corpus
 “ intumescat ex alba *pituita*, crassa et frigida,
 “ *Phlegmatias* ei nomen est; si in humo-
 “ rem sanguineum, aquosum, tenuem, carnes
 “ liquatæ fuerint, hydrops *anasarca* genera-
 “ tur*.” HIPPOCRATES autem *leucophleg-*
matiam in *hydropem* tandem desinere, et esse
 quasi hujus morbi initium, existimavit. Hinc
 igitur cum WILLISIO et CULLENO concludere
 licet,

* ARETÆI, lib. 2. cap. 1.

licet, non in specie, sed gradu solummodò discrepare.

S I G N A.

Tumor levis talorum pedumque, noctu præcipuè conspicuus, mane verò, fere vel omninò recedens, anasarcæ incipientis primum indicium facit. Hicce tumor vi resiliendi carens, mollis, albus, et frigidus est, impressæque digiti vestigium retinet. Indicia autem adeo leviâ, in principio tantùm hydropis reperiuntur. Progrediente enim morbo, ab inferioribus membra ad superiora gradatim tumor ascendit. Femora, scrotum, brachia, et manus, facies, præcipuè palpebræ, aliæque corporis partes, tument, aquâ impletæ. Propter quarundam etiam partium structuram, situmque, hæ plùs minùsve humore effuso distenduntur. Hinc scrotum in viris, pudendorumque labia in feminis,

minis, cellis laxioribus instructa, et nihil adipis habentia, vi aquæ facilè cedunt, adeóque præ cæteris in mole augentur. Ab ipso morbi initio, fitis infatiabilis urget, hinc verba poetæ :

“ Quo plus sunt potæ, plus fitiuntur, aquæ.”

Urina tamen fluidi exhausti quantitati minimè respondet, sed parcissimè, et quandoque rubra crassaque redditur.—Pulsus plerumque parvi et debiles, interdum tardi, perrarò denique validi et duri micant. Comes est sæpè alvi durities ; nonnunquam diarrhœa urget. Cutis arida et frigida tactui reperitur, atque sudor ægrè elicitur.

A magna partium distentione, cutis sensum adeò obtusum interdum evasisse dicitur, ut ægrotus, causticis etiam potentissimis ei admotis, nihil doloris senserit. Dr D. MONRO ex BOERHAAVIO cujusdam hydropici exemplum

plum citat, in quo exustio, carbone candente facta, aquas omninò deduxit, vulnere ab ægro non percepto*.

Ingravescente morbo, magis magisque corpus distenditur, adeò ut ore lurido tumidoque, spectaculum adstantibus luctuosum exhibeat. In hoc morbi stadio, interstitiis telæ cellulosæ, quæ anasarcæ fedes est, per totum corpus inter sese connexis, *latex* in cellulas, diversa viscera, præcipuè pulmones, circumdantes, infunditur; et hinc indicia, singulis eorum propria, nascuntur. Cellulas quoque medullares ossium in *anasarca*, sero locum medullæ occupante, repletas observavit SOEMERING †. Cùm morbus jam adoleverit, plurimæ corporis functiones admodum læduntur. Corporis languor, summaque debilitas obrepunt: cibi appetitus decedit; concoctio depravatur; et

succus,

* Treatise on Dropsy.

† De Morbis Vasor. Absorb. p. 130.

fuccus, quo corpus ali solet, deficit. Spirandi difficultas, præcipuè post citatiorem incessum, tussis sicca, aliquando febris hæctica, his accedunt, et morbo afflictum admodum vexant. Dehinc citissimus virium lapsus sequitur.

Nunc morbo ad exitium properante, pulsus languent, vacillant, et deficiunt. Spiritus difficillimè, anxieque trahitur, et ita mors pedentim obrepens, finem doloribus vitæque imponit.

Exempla autem quædam, ab auctõribus diversis tradita legi, in quibus æger, sine ulla causa evidente vel ante vel post mortem sese prodente, subitò et improvisè e medio excessit. Dr D. MONRO hujusce generis duo exempla se vidisse narrat. In singulis verò ægroti aquâ deonerati, indiciis felicis ominis existentibus, morte subitanè correpti sunt; atque cadavere alterius inciso, nullum vitium, talem effectum gignere aptum, inventum est*.

Doctores

* Loc. citat.

Doctores WITHERING * et FERRIAR †, pluri-
mique alii, ejusdam generis exempla memo-
riæ tradiderunt. Sub finem quoque morbi,
stupor sæpius, coma, compressique cerebri alia
teterrima signa adjiciuntur, et agmen clau-
dunt.

DE HYDROTHORACE.

A temporibus HIPPOCRATIS, (qui signa hu-
jusce morbi, et communia, et *Pathogmonico-
rum* haud pauca, adamussim literis mandavit),
scriptores ordine sequentes, usque ad seculum
decimum septimum, pro sua dignitate de hac
re minimè differuerunt. Alii vero hunc mor-
bum tractantes, de paucioribus ejus sympto-
matis, et raptim, mentionem fecerunt; ab aliis
haud omninò memorantur: “ Unde (ait clar.

B

“ DE

* Treatise on Foxglove, Cases 6th, 22d.

† Med. Hist. and Reflections, vol. i. p. 98.

“ DE HAEN) concludere nos cogunt, morbum
 “ ipfis minus in viventibus ægris, quàm in
 “ denatorum cadaveribus patuisse *.” In
 temporibus autem recentioribus, clari illi viri,
 LOWER, WILLIS, DE HAEN, plurimique alii,
 de morbo ex professo scribentes, de hydrotho-
 racis indiciis, nos certiores fecerunt. Exem-
 pla etiam multa, a Coll. LOND., EDIN., PARIS,
 etc., memoriæ tradita, scientiam nostram de
 natura hujusce morbi, haud parùm promove-
 runt.

Hydrothorax, nisi jam morbus inveteraſcerit,
 ſigna adeo dubia incertaque exhibet, ut me-
 dicorum oculis, àtrâ quaſi nocte involutus,
 ſæpiùs evadat. Hæc omnia indicia, quæ me-
 dici Pathognomica appellant, non ſemper ſeſe
 in conſpectum dediffe per totum morbi cur-
 ſum, et in multis exemplis tantùm paullò ante
 fata ſuperveniffe, cl. DE HAEN procul dubio
 monſtravit. Hic medicus quidem, hoc ma-
 lum,

* Ratio Medendi, vol. ii. cap. 3.

lum, in “incertiffimorum” morborum classe locavit; et forfitan haud immeritò. ZIMMERMANUS etiam hydrothoracem sæpè, non nisi appropinquante morte, certè detegi testatur. De hac re autem fusiùs in Diagnosi loquemur.

His præmissis, ad signa enumeranda notatu digna, e scriptoribus medicis diversis excerpta, statim progredi debemus; prius autem definitio, a celeberr. CULLENO huic morbo data, præmittenda est. Definitur, “Dyspnœa; “faciei pallor; pedum œdemata; urina parca; decubitus difficilis; subita et spontanea ex somno cum palpitatione excitatio; “aqua in pectore fluctuans.”

SIGNA.

S I G N A.

Cum humor aquosus in pectore præter naturam coacervatur, *hydrothoracis* signa nascuntur.

Hic latex ferofus, vel in alterutra, vel in utraque pectoris camera includitur; aliquando autem (ut in anasarca tractanda observatum est) in tela cellulosa, qua pulmo vincitur, cumulatur, morbusque œdema pulmonum appellatur; et hinc signa diversa, in diversis exemplis, oriri reperiuntur.

Ingruit hydrothorax, cum cibi fastidio, coctioneque depravata; corpus interea præter consuetudinem macrescit, vegetusque color et decor faciei deflorescunt. Sub morbi initio, ponderis et anxietatis sensum ad partem sterni inferiorem sentit æger. Hoc signum adeò autem lene est, ut vix ab ægro ipso vel amicis animadvertitur,

animadvertitur, ideoque auxilium medici non postulatur; e contrà, qui malè se habet, morbo interim in pejùs ruente, more solito in publicum prodit, consuetis muneribus fungi perstat, suisque amicis, ut olim, se exhilarescit. Brevi vero, dyspnœa, palpitatio cordis, et tufficula supervenientes, præcipuè post exertationem solito violentiorem, veluti cursum, aut incessum citatiorem, maximè cum æger, locos acclives, collem nempe, vel scaldas ascendit, signo priori adjunguntur.

Post tempus, morbo magis gravatum, dyspnœa hætenus vaga et fugax, nunc constantior, noctè præcipuè, corpore recumbente, urget.

Ægroti ad somnum sese conferentis molestiæ ad tempus pacantur; sed brevi tantùm requieto, somnus levis, exiguus, vix inchoatus, infomniis terrificis, et suffocationis metu sæpè turbatur, et manè vix renovatus e lecto confurgit. Tuffis molestior fit, nocturnam dyspnœam præcipuè cemitans, sputo parcè ejecto.

Difficilis

Difficilis etiam decubitus plerumque in latus sanum fit, si in unum solummodò fundatur aqua ; tunc enim respiratio difficilior redditur, increfcuntque tuffis et anxietas. Interdum fed perrarò alitèr accidit, (pulmone ipfo nempè, qui ab aqua liber eft, labefacto, altero autem, qui aquâ circumdatur, refpirationem folo abfolvente), ut ægrotus, in latus tantùm humore immune, conquiefcere et refpirare poffit. Aliquando autem in neutrum decumbere queat, fed folum in tergum jacens, quietem fragilem caducumque rapit. Paulò poft inceptum morbum, sæpè etiam ipfo ejus initio, et haud rarò affectionem pectoris antecedens, fcroti pedumque œdema feffe oftendit.

Dolor lenis et torporis fenfus, vel potius quædam paralyfis, brachium utrumque vel alterutrum afficientes, femperque in latere laborante, fi unum tantùm laboret, ftadium mali maturum, crebrò comitare folent. Urina ut in aliis hydropis generibus, parca, fubruba, craffaque

crassaque redditur. Pulsus plerumque fiunt debiles, parvi, morboque pericardium vel pulmonis telam cellulofam occupante, irregulares et intermittentes: nec defunt exempla, in quibus duri et validiores solito comperti sunt. Talibus signis pergentibus, gradatim crescit malum. Summâ difficultate nunc spirat æger; tuffique moleftiore pectus concutitur, fed fputa pauca et fpumofa ejiciuntur. Corporis exercitium etiam leve, fine fuffocationis periculo perfici nequit. Morbus ad hoc ftadium pro- vectus, magnoperè ingravescit, fignisque atrociffimis ftipatur. Nunc noctes tragicæ, dies- que inquietiores ægrum fatigant; nunc mifer fomni blanditiis vix et ne vix quidem potitur; quieti enim feffe conferens, brevi ab eo dere- pentè excitatur, et ad fuffocationem instantem evitandam, ftatim feffe erigere, aliquando etiam e lecto furgere impellitur. Nunc omnia, fi fieri poffit, in deteriora ruunt. Ægrotus erecto cervice, aut prono corpore, tantùm spi- rare

rare potest; color lividus labia, vultumque obducit, indicium infaustissimum! tandem lypothymiis et syncope supervenientibus, denique subitò suffocatur ægrotus.

DE ASCITE.

CULLENUS illustriss. definitionem hujusce morbi verbis sequentibus enunciavit; “ Ascites (abdominalis) cum tumore totius abdominis, æquali, et cum fluctuatione fati evidente.”

Ascites, sine ullo alio hydropis genere, sæpè invadit; aliquando autem anasarcae supervenit; hydrothorace quoque nonnunquam adjecto.

S I G N A.

S I G N A.

Ineunte ascite, augmentum abdominis leve, vix notatione dignum, ad regionem hypogastricam observatur. Mox autem adaugefcit tumor, perque totum abdomen se extendit. Distentio et ponderis sensus, secundum corporis positionem, sedem multò variant. Erecto corpore, aqua pondere suo ad inferiorem abdominis partem gravitans, regionem hypogastricam occupat et distendit; recumbente autem ægro, humor hydropicus ad partes superiores surgens, diaphragma premit, descensumque ejus impedit; unde decubitus difficilis, dyspnœa urgens, tuffisque molesta, gignuntur. In situ etiam horizontali, aqua distendit lumbos, et ad latus cui æger incumbit præponderans, ibi magis percipitur, dum in latere adverso simul tumor pro rata parte decrefcit.

Morbo aliquandiu processu, manu in latus alterum expanso, latereque opposito digitorum apicibus percusso, aqua per abdomen undans facilè sentitur; ipsum aegrotum quoque corporis posituram mutantem minimè latet fluctuatio.

Dolor hepatis regionem occupans haud rarò effusionem antecedit, eamque comitatur. Hepar etiam in nonnullis exemplis adeò amplificatum evadit, ut tumor, fluido paracentesi vel medicamentis remoto, extrinsecus sese ostendat, causamque morbi lucidè demonstrat.

Omnes functiones, tum naturales, tum vitales, tum animales, malè peraguntur. Viscera chylopoietica digestioni minùs inserviunt; borborigmi, flatus, aliaque dyspepsiæ signa oriuntur, et ad abdominis tumorem augendum haud parùm conferunt.

Cum aliis hydropum indiciis, aeger ad mortem sensim, certè tamen appropinquat. Dyspnœa, tussis, abdominis distentio, aliaque indicia

dicia quotidie ingravescunt. Dolores abdominis vehementes, cum diarrhœa pertinaci nullis remediis superanda, adjiciuntur. Franguntur vires; torpet æger; horrida macies partes colluvie ferosâ haud occupatas obripit; multaque passus supremum demùm spiritum efflat.

Cultro anatomici testante, intestina aliquando coalescere, aliisque inflammationis signis corripî, reperta sunt. Cl. FERRIAR* tria exempla, in quibus diarrhœa ultimum morbi stadium comitata fuerat, se observasse scribit; horumque cadaverum intestinis valdè inflammatis, talem exitum ascitæ inveteratæ propriam esse judicavit.

D I A-

* Loc. citat. p. 98.

D I A G N O S I S.

Quoniam nonnulli alii morbi quodammodo hydropem referunt, pauca indicia, quibus hic distinguatur, notanda sunt.

Anasarca ab omnibus aliis morbis dignosci facilè potest, ex eo quod fovea, premente digito, aliquandiu in parte pressa manet. In *polysercia* quoque pedes, talique, vesperem versus, minimè ut in *anasarca* tument. Crepitus qui per manûs frictionem in *emphysemate* percipitur, et tumoris elasticitas, eam inter et *anasarcam* diagnofin certam præbet.

Haudquaquam verò de *hydrothoracis* præsentia tam facilè judicari potest. Multa ejus signa alios quoque pectoris morbos comitari solent, et nonnunquam quoque ea, quæ pathognomica habentur, vel omninò defunt, vel faltem ante morbum diu protractum, sese non ostendunt.

Indicia,

Indicia, quæ Medici *pathognomica* hujusce morbi ducunt, sequuntur.

1^{um}, *Repentina somni interruptio, cum intentatis suffocationis minis.* Cl. DE HAEN * autem hunc morbum tractans, hoc signum, quamvis sæpè adfit, in multis tamen exemplis gravissimis, omninò abesse, in aliis, paucis ante mortem diebus tantùm apparuisse, apertè evicit.

2^{dum}, *Oedema et Paralysis alterutrius vel utriusque brachii et manus*; quod vix multò certius est signum. Idem cel. auctor enim, se observasse hoc indicium, in altero ægroto octiduo, in altero quatrduo solùm ante obitum, memoravit.

3^{tium}, *Fluidi fluctuatio.* HIPPOCRATES nos admonuit, “ Hominem nempe in fedili
“ collocatum humeris validè concutere et mo-
“ vere; ut sic, aure mox ad latus admotâ,
“ undulans aqua percipi possit †.” Fluctua-
tio

* Loc. citat. vol. ii. cap. 4.

† Lib. de Affectionib. Internis apud FÆST. tom. i.

tio autem est minimè constans ; multique Medici, se nunquam, vel faltem rarissimè, eam animadvertisse fatentur ; nec talis concussio violenta in hydrothorace periculo caret. Hæc signa igitur, hydrothoracis pathognomica minimè appellanda sunt :—et minimè quidem, propter unum aliquod signum hunc morbum adesse, sed ex plurimis symptomatis conjunctis, judicandum.

Signa hujusce morbi certiora accuratè et eleganter a BURZERIO enumerata, in ejus accipe verbis : “ Ego quidem, siquid judicem
 “ neque uno, neque altero signo confitendum
 “ esse arbitror, sed singula cautissimè primùm,
 “ deinde omnia expendantur oportet, antequam de eo feratur sententia. Itaque si,
 “ diligenti initio examine, multa simul copulentur ex iis, quæ pro diagnosticis signis
 “ enumeravimus, quid hydrothoracem adesse dubitaveris ? Exempli causâ, si empyematis
 “ causæ defuerint, fuerint verò quæ hydropi
 “ inducendo

“ inducendo aptæ noscuntur ; si respiratio
“ difficilis jam fit, aut a quovis corporis motu
“ fiat anhelosa aut erectâ cervice duci debeat ;
“ si ob suffocationis metum somnos repentè
“ interrumpat ; si decubitus in alterutrum
“ latus difficilior evadat ; si fluctuatio quæ-
“ dam in pectoris cavea percipiatur ; si ar-
“ tuum imprimis inferiorum aut scroti œde-
“ mata, tussis præsertim sicca, fitis, urinæ
“ parcitas, concurrant ; si latus affectum œde-
“ ma exterius ostendat, quod interdum evenit,
“ aut scapula et brachium respondens tumeat,
“ et torpeat, quod frequentius est ; profectò
“ non erit, cur certiora de hydrothorace signa
“ desideres *.”

Ascites ab omnibus aliis morbis, præter hydropes saccatos, facilè internoscitur, sensu aquæ fluctuantis, manu uni lateri admotâ, et latere adverso digitorum apicibus percusso.

In

* BURZER, Instit. Med. Practic. vol. iv. De Hydrope Pulmonum, &c.

In *tympanitide*, vice aquæ undulantis, abdomen manu pulsatum, sonitum instar tympani edit.

Polyfarcia non solum undulatione vacat, sed etiam in eo umbilicus retrahitur; in *ascite* autem extrinsecus protruditur.

Diagnosif inter *ascitem* istam, cui schirrus hepatis dat causam, et *hydropes istos saccatos* in abdomine collocatos, sæpius perdifficilis est. Ut certò dijudicetur, morbi causa, progressus, sedesque primaria, accuratè observanda. Ascites abdominis vera multa præbet indicia, quorum saccatus omninò expers est. Illius, urinæ parcitas, fitis ingens, in hypochondriis dolor, macies corporis, comites esse solent; hic autem his omnibus vulgò caret.

C A U S A

CAUSA PROXIMA.

Vasa quanquam resorbentia jamdudum inter Medicos cognita sunt, scientiam tamen nostram accuratiorem eorum physiologiæ et pathologiæ scriptoribus magni nominis recentioribus debemus, inter quos, Prof. noster celeberr. MONRO, HUNTER, HEWSON, et CRUICKSHANK, præcipuè memorandi sunt.

Omnia corporis cava, tum magna, tum parva, veluti caput, thorax, abdomen, intercapedinesque telæ cellulosæ undique, halitu aquoso e vasis exhalantibus separato, perpetuò irrorantur. Hicce latex, qui pars tenuior sanguinis est, per vasa supradicta justâ quantitate exhalatus, in corpore admodum utilis est. His enim partibus, quæ sese invicem atterunt, ab eo lubricatis, motum liberiores reddit, et adhæSIONES, quæ aliter evenirent, impedit.

Dum corpus a fanitate firma adhuc nil de-
flexerit, ne liquidus effusus coacervetur, latex
ofculis hiantibus vaforum lymphaticorum,
quibus omnia ista cava cumulatè suppeditan-
tur, affiduè reforbetur, et per ductûs thoracici
viam tranfit, ad cor denique reducendus. La-
tex quando talis in istis corporis partibus
supra recensitis præter modum accumulatur,
ibique stagnat, hydrops adefse dicitur. In
ascite, ex. causâ, propter numerum vaforum
rubrorum, visceribus super abdominalibus
sparforum, spatiumque quod occupant ramuli
eorum, eodem tempore venis valvulis caren-
tibus, effusio feri permagna e vasis exhalan-
tibus ut sequatur necesse est: Par igitur nu-
merus vaforum reforbentium ad hunc laticem
refumendum requiritur. Nec interest, five ex-
halatio adeò augeatur, ut vasa absorbentia fe-
rum effusum amovere nequeant; five abfor-
bentium actio ita minuatur, vel trunci eorum
adeò comprimantur et obstruantur, ut exha-
latio,

latio, licèt copiâ naturali facta, haud plenè resumatur. Utraque causa conjuncta ad hunc morbum gignendum frequentissimè confert.

Præter exhalationem auctam et absorptionem imminutam, inter causas hydropum aliam, rarissimam quidem, rupturam nempe ductûs ipsius thoracici vel quorundam ejus ramulorum, Medici recensent.

SEM IN IA.

Omnis ætas, sexus uterque, temperamenta varia, causis excitantibus satis validis existentibus, hydrope corripuntur. Nil dubitandum tamen, nonnullos præ cæteris huic morbo obnoxios esse. SYDENHAMUS accuratissimus, sexum muliebrem sæpiùs, quàm virilem, hydrope infestari notavit. Seniles multò frequentius, quàm juvenes, secundâ valetudine florentes aggreditur. Corporis debilitas, sive congenita,
sive

five extrinsecus ex variis causis originem ducens, hydropi maximam proclivitatem præbet; sæpius quidem, sine ulla causa concurrente morbum faciens.

Homines *temperamenti phlegmatici* morbo adeò opportuni fiunt, ut causâ etiam leniore excitante applicatâ, in hydropem incidant. Hinc fortasse hydrops nonnullos apud Medicos morbus hereditarius habetur; quo intelligenda est corporis dispositio vel constitutio, certis quibusdam morbis a natura proclivior, a parentibus proli suæ tradita, eodem modo ac liberi, tam in vultu corporisque forma, quam animi indole, virtutibus et vitiis, parentes sæpe referunt. “ Imperiosa gens CLAUDIA diu
 “ Romæ floruit, impigra, ferox, superba: ea-
 “ dem illachrymabilem TYBERIUM, tristissi-
 “ mum tyrannum, produxit; tandem in im-
 “ manem CALIGULAM, et CLAUDIUM, et
 “ AGRIPPINAM, ipsumque demum NERONEM,
 “ post sexcentos annos, desitura *.”

Consentiunt

* Conspect. Med. Th. p. 7.

Consentiunt omnes, quòd sanitas vigorque corporis conserventur, et functiones ejus variæ aptè absolvantur, exercitium admodum necessarium esse. Hinc duæ res, quæ languorem afferunt omnibus, huic morbo proclivitatem inducunt, otium et inactivitas. Homines, propter hanc causam, a corporis exercitatione, negotiisque solitis prohibiti, vitamque sedentariam agentes, hydropi valdè proclives esse solent. Appetitus enim deficit; ciborum concoctio depravatur; vasorum actio minuitur; variæ secretiones impediuntur; unde viri vitam ignavam ducentes, luxuriæque dediti, languidi, infirmi, debiles, variisque morbis proni, evadunt.

Morbi antecedentes omnes diu protracti, præcipuè autem febres intermittentes, scarlatina, et dysenteria, aut corpus debilitando, aut obstructions viscerum organicas inducendo, hydropi ansam præbent.

Huc

Huc quoque victus tenuis et aquosus, corporis exercitationi impar, affectus animi deprimentes, aër humidus et frigidus, exinaniationes largæ, præfertim fanguineæ, referri debent. Hydropem in Batavia, ubi aër humidus est, præ cæteris regionibus grassari dictum est; et clariss. HOME observavit, viros hydropi maximè pronos esse “in humido aëre degenerantes, vel opus aquaticum exercentes, quales sunt lotores et piscatores*.” Liqueorum inebriantium, præcipuè spirituum ardentium usum intemperatum hydropis causam frequentissimam esse, uno ore Medici conclamant. Liqueores tales, non solùm genus nervosum magnopere vastant, sed dirum et sæpius insanabilem ascitem, ab hepatis obstructione et schirro, quæ modo nobis incognito producuntur, gignere sæpè solent. Ex his omnibus, SYDENHAMUS rectè observavit, “quod bibacissimi

* Principia Medicinæ (de Hydrope).

“ ciffimi quique helluones sæpiùs cum hoc
 “ morbo, frigido licet, quam cæteri conflic-
 “ tentur*.”

Conditiones autem corporis admodum diverfæ, huic morbo proclivitatem inducere, a quibusdam fcriptoribus recentioribus dicuntur. Dr GRAPENGIESSER †, in differtatione fua de Hydrope Plethorico, in duas fpecies, nempè, hydropem plethoricum *acutum* et *chronicum*, hoc genus dividit. Priori, viros robuftiores faturosque, ætate integrâ florentes, præcipuè fabros ferrarios et lignarios, obnoxios effe notavit; pofteriori, homines crasis laxioris et fpongiofæ, fenectute confectos, quibus appetitus cibi bonus, fed concoctio prava eft, vitamque fedentariam degentes.

CAUSÆ

* SYDENHAMI opera, (de Hydrope, p. 483.

† Annals of Medicine, v. i. art. 15. p. 176.

CAUSÆ EXCITANTES.

Ex omni parte cùm hunc morbum spectemus, frugifera et fructuosa est investigatio de ejus natura; nec ulla pars inculta ac deserta fit; tum nullus feracior in eo locus est, nec uberior, quam DE CAUSIS EXCITANTIBUS; namque prædisponentes antedictas, si fieri possit, corrigendo, excitantes autem vel evitando, vel, si jam insint, amovendo, venienti morbo occurrimus, et morbum jam corripientem corripimus: Unde de medendo aut morbo præcavendo methodus congruens ducitur.

Plurimæ quoniam inter causas multiplices excitantes ex incisis cadaveribus facilè explicantur, quasdam ex iis, a diversis scriptoribus traditas, inter causas sequentes spargere haud alienum erit. Varii auctores, magnam laudem, nostro judicio, consecuti sunt, quorum
industriâ,

industriâ, tot exempla morbida collecta literis mandata sunt. BONETUM et MORGAGNIUM, qui sectiones exactissimè descriptas memoriæ tradiderunt, in hac re potissimum secuti sumus.

Hydrope e laticis in quavis corporis parte coacervatione nascente, et hac accumulatione, ex exhalatione aucta, absorptione minuta, aut rupto vase lymphatico, originem suam trahente, ad quasnam causas, mutationes tales morbosæ referri debent, proximè disquirendum.

Exhalatio aucta necessaria sequela est omnis causæ, quæ impetum sanguinis in arteriis augendo, ad fines earundam exhalantes vî insolitâ eum premit, majoremque partis tenuioris sanguinis copiam per ramos propellit. Nihil æquè ad hanc rem conferre videtur, ac sanguinis in venis coacervatio. Sanguinis enim ita impediti per venam cavam descendentem ad cor reducis transitus ex arteriis extremis ad

venarum initia prohibetur. Hoc impedimentum igitur nituntur superare arteriæ ; sed pars tenuior sanguinis faciliorem per vasa exhalantia, quam per venas, aditum inveniens, fluidi tantum in caveas singulas, five in telæ cellulosæ interstitia, per arterias exhalantes transire cogitur, quantum absorbentia recipere recusant ; distentio igitur præter naturam fit, formaturque hydrops.

Tumores œdematosi, ex ligaturis circa membrum, ita ut venæ et non arteriæ comprimantur, nascentes, hanc rem satis demonstrant.

Experimentum pulchrum a LOWERO institutum, pressuræ, et inde sanguinis coacervationis in venis, effecta optimè illustrat, qui “ perforato dextro latere thoracis canis, venam cavam vinculo strinxit ; dein, relaxato pectore, vulnus confuit. Peracto autem experimento, canis mox oblanguebat, et intra paucas horas expirabat. Dissecto abdomine, magna

“ na

“ na feri quantitas enatare conspiciebatur,
“ non aliter quàm si ascitâ diu laborâffet *.”

CAUSÆ GENERALES reditum sanguinis impedi-
pedientes, exhalationemque augentes, ad duo
capita referri possunt.

I. CAUSÆ quæ reditum sanguinis totius ad
cor impediunt.

Quædam cordis ipsius conditiones, iter san-
guinis per cava ejusdem impediunt, vel ple-
nam eorum depletionem prohibentes, vel in-
gressum ejus quantitate solitâ, in auriculas
a venis, in ventriculos ab auriculis, aut demum
in arterias a ventriculis, præpedientes, hoc
maximè efficiunt. Ponatur exemplum; dex-
tro cordis ventriculo putà, ipsam sanguinis
quantitatem, quæ auricula ejusdem lateris ei
tradere vult, accipere, vel ventriculo, sangui-
nem

* Tract. de Corde, cap. 2.

nem jam acceptum in arterias impellere, recufante, quid fequitur? Auricula, propter fanguinem in ea cumulatum, ita diftenditur, ut quantitatem folitam a vena cava admittere haud poterit, fyftema totum venofum præter naturam onerabitur, et actio arteriarum ad renixum vincendum intendetur; fed parte tenuiore fanguinis nunc aditum faciliorem per vafa exhalantia, quàm per venas rubras, habente, humoreque in cavis, vel telæ cellulofæ ubique corporis interftitiis, deposito, ut hydrops non confequatur non poteft.

Cavis cordis fingulis contractionibus haud depletis, eadem cumulatio in corde, idem renixus in venis, arteriarum eadem actio aucta, eademque demum in cava corporis laticis effufio, neceffariò gignuntur. Ex. gratiâ, valvulis femilunaribus ventriculi cordis finiftri in os converfis, et officiis fuis fungi minimè aptis, ventriculus feffe exinanire nequeat, vel faltem fanguis, aortâ fe contrahente, retrorsùm in
ventriculum

ventriculum partim regurgitat, in auricula sinistra, in venis et arteriis pulmonalibus, in ventriculo et auricula dextris, in venis demum, coacervandus ; hinc pulmonum anasarca, hinc ascites, hinc totius corporis œdema, oriuntur.

His perpensis, facilè intelligendum est, quomodo vitia cordis omnigena, valvularum ipsius, et vaforum vicinorum constrictio, amplificatio, conversio in os, et polypi, effectus suos præstare possint. Cadaverum sectiones plurimorum, inter vitam hydrope laborantium, talia cordis vitia adfuisse certissimè evincunt.

Nil dubitandum, quin in ægris jam viventibus polyposa cordis concretio aliquando nascatur, et liberum ejus cavorum actionem et depletionem impediendo, hydropem inducere possint. In ægrotantium enim cadaveribus quibus ante mortem indicia cordis vitii organici manifestò adfuerunt, nihil vitii præter concretiones polyposas in ventriculis vel auriculis fitas, comperitum est. Quamplurimæ hydropum histo-

riæ a tali causa orientium, a BONETO, MORGAGNI, aliisque anatomicis eximiis, nobis traditæ sunt. Exempla hydropum viginti, aut plura, a BONETO * memorantur, quibus vitia cordis, præsertim polypi, causam præbuisse videntur. HOFFMANNUS, de hac re differens, ita dicit: “ Deinde, si meam ipsius experientiam licet proferre, ego plenâ fide testari
 “ possum omnes ferè quos secandos curavi
 “ hydropicos, præter viscera male constituta,
 “ polypôsa in corde ejusque vasis habuisse
 “ concreta †.”

Dr D. MONRO in Diff. Inaug. exemplum hydropici ab eo dissecti memoriæ prodidit,
 “ ubi non alia inventa est hydropis causa
 “ quam valvularum mitralium cordis finistri
 “ ossificatio; unde adeò restrictum fuit sanguinis iter, ut digitum minimum vi impul-
 “ sum

* BONET. Sepulchret. Anat. lib. 3. sect. 21. Obs. 3.
 De Hydrope.

† HOFFMANNI oper. cap. 14. de Hydrope, Th. path. § 11.

“ sum vix reciperit ostium ventriculi. Cor
“ prægrande fuit. Dum inter vivos effet
“ homo, a singulis cordis ictibus elevabantur
“ adeò omnes colli partes, ut ipsæ venæ pul-
“ fare viderentur*.”

Permanentes pulmonum obstructiones. Re-
spiratio ab innumeris causis sæpè adeò impe-
ditur, ut transitus sanguinis per pulmonum
vasa ferè prohibetur.

Sanguine propter hanc causam in pulmoni-
bus, et ventriculo et auricula dextris, coacer-
vato, indicia hydrothoracis aut pulmonum
anasarçæ, necessariò oriuntur. Bronchiorum
cellulæ vix aëre permeabiles haud rarò repe-
riuntur. Quod si res ita se habeat, non fieri
potest, quin mutatio ista salubris, quæ sanguis
per pulmonem transiens, ab aëris contactu et
fortassè oxygeni ex atmosphæra absorptione,
subire debet, absolvi nequeat.

Hinc

* Thef. Inaugur. in Thef. Med. vol. ii. p. 200.

Hinc sanguine ad munera sua propria in œconomia animali fungenda inepto existente, præter pressuram in venis factam, languor, virium lapsus, diathesisque hydropica, consequuntur.

Causæ vitiorum talium in pulmonibus multiplices sunt. Tumores diversi generis, veluti schirri, tubercula, vomicæ, et e vasis effusiones, quæ pulmonum inflammationem sequuntur, inter causas hydropis, scriptores rectè recensent, hac conjecturâ experimentis anatomicis stabilitâ. Sic tractat BURZERIUS :
 “ Id sæpissimè patet ex cadaverum sectioni-
 “ bus, in quibus frequentissimè detectum est,
 “ præcipuè pericardii et pectoris, aliquod in
 “ venis majoribus circa præcordiam vitium,
 “ quo liber in cor refluxus cohiberetur, exti-
 “ tisse *.”

Observat

* Vol. iv. De Hydr. pect. pulmonumque. Vide etiam BONET. Sepulch. loc. cit. Cas, 14.

Observat Dr D. MONRO, “ In thorace ple-
 “ rorumque ex phthisi pulmonali mortuorum
 “ plus minus aquæ semper ferè deprehendī*.”

Plenitudo venarum universa. An hæc pro
 hydropis causa jure agnosci debeat, necne,
 magnoperè dubitandum est. CULLENUS ex-
 perientiâ præditus de hac re dubitare videtur,
 et hisce verbis sententiam suam cautè tradit :

“ It may be supposed, that a general præter-
 “ natural plethora of the venous system may
 “ have the effect of increasing exhalation ;
 “ and that this plethora may originate from
 “ suppression of fluxes, or evacuations of
 “ blood, which had for some time taken place
 “ in the body, such as the menstrual or hæ-
 “ morrhoidal fluxes. A dropsy, however,
 “ from such a cause, has been at least a rare
 “ occurrence ; and when it seems to have hap-
 “ pened, I should suppose it owing to the

F

“ same

* Loc. citat.

“ same causes as the suppreffion itself, rather
 “ than to the plethora produced by it*.”

Si hydrops ex hac causa unquam oriatur, cumulatïo in venis præter naturam facta, liberum sanguinis reditum ad cor impediendo, eodem modo ac causæ obstructionis jam recensitæ, effectus suos edere potest; vel hæc lege œconomix animalis generali experientia confirmatâ, quod cum actio partis alicujus ullo modo repressa fuerit, vis aliûs corporis partis, ut huic obsistatur, pro rata parte contra naturam intenditur.

Hydrops seu ab hac causa (plethora nempe venarum) originem trahens, siue non, testantibus HOFFMANNO †, FORESTO ‡, plurimisque aliis, aut evacuationes solitas suppressas, menses nimirum, et fluxum hæmorrhoidalem, aut repulsas eruptiones, aut demum perspirationem

* First Lines, vol. iv. p. 257.

† HOFFMAN. lib. cit. cap. 14. Thef. Path. § 23, 25.

‡ FORESTI Opera, lib. 19. Obs. 20. 24.

tionem a frigore obstructam, sæpissimè consequitur. BONETUS * etiam tria ascitæ exempla insignia ab *ischuria* nascentia narrat.

2. CAUSÆ quæ reditui partis sanguinis solummodo obstant.

Positura corporis. Ab ipso sanguinis pondere, si quis debilis in pedibus diu institerit, talis renixus reditui sanguinis per venas opponetur, ut eo ægriùs ex arteriis in illas recepto, per vasa exhalantia humor impellatur; hinc talorum tumores œdematosi vesperem versus oriuntur in plurimis, qui morbis longinquioribus languescunt.

Tumores viscerum abdominalium per schirrum vel steatoma facti. Cadaverum sectiones hydropicorum, signa antecedentia, et in multis exemplis præsentia, vitia viscerum abdominalium, amplificationem, schirrum, et in primis
hepatis

* Lib. citat. 3. Sect. 21. Ob. 8. Caf. 7, 8, 9.

hepatis obstructionem, hydropem sæpe gignere, certissimè probant.

Præclarus SWIETENIUS has causas tractans, ita dicit: “ Hæc frequentissima hydropis
 “ causa observatur, et quidem adeò, ut, si ex-
 “ cipiantur hydropes qui a potu frigido af-
 “ fatim ingesto oriuntur, uti et illi qui ab eva-
 “ cuationibus nimis sanguinis fiunt, pauci
 “ occurrant casus in quibus non inveniatur
 “ unum, vel et plura viscera schirrosa *.”

Exempla triginta a BONETO † collecta, quorum hepar diversum morbo affectum, causa hydropis fuisse videtur. In uno exemplo hepatis speciem describit, quo “ ligni naturam
 “ imitaretur ;” et aliam memorat FORESTUS, quæ “ lapideam quasi duritiem” assumpserat.

Hepar

* Commentar. vol. iv. aphor. 1229. p. 195.

† Loc. cit. Obs. 3.

Vid. etiam TULPII lib. 3. cap. 36. et
 HORSTII lib. iii. Obs. 9.]

Hepar inflammationi duplicis generis obnoxium est, *acutæ* scilicet, et *chronicæ*. Hæc genera duo, in visceris hujusce amplificationem, vel conditionem schirrosum, frequenter degenerant. Aliis in exemplis, jecur amplificatum, aliis vero, exiguum, contractum, durum et gibbosum, aliis demum, tuberculis obfitum, apparet. Hepar contractum, non solum consolidatum, sed jacturam ponderis veram sustinuisse, compertum est *. Viscus, ad munera sua in corpore parum idoneum factum, absorbentibus tollitur, reorptumque, non secus ac moles animali inutilis aut nocua, corpore ejicitur.

Reditus sanguinis ex visceribus abdominalibus admodum insignis est, et inde hydrops in abdomine sæpius gignitur. Cursum sanguinis ex his visceribus ad cor redeuntis, per jecur tranfituri, breviter et accuratè celeberr. noster GREGORIUS his verbis describit : “ Sanguis ab
 “ omnibus visceribus quæ cibi concoctioni
 “ inferviunt,

* SAUNDERS on the Liver, cap. 4. p. 179.

“ inferviunt, ventriculo, intestinis, mesenteria,
 “ omento, pancreate, redux, in magnum vas
 “ defertur, venam scilicet portarum; quæ
 “ denuo, arteriæ more, per jecur diffusa, in-
 “ gentem sanguinis copiam ei defert: qui
 “ tandem, postquam fellis secretioni infervie-
 “ rit, per cavam hepaticam, in magnam ca-
 “ vam et ad cor redit *.” Ex hac descrip-
 tione, satis constat, totum sanguinem per vis-
 cera abdominis chylopoietica circumferentem, in
 reditu ejus ad cor, per jecur ex necessario
 transmittendum esse. Hinc patet, cur ascites
 tam sæpè insanabilis, vel anasarca corporis
 universalis non minus lethalis, ex hepatis vitio,
 ferius occlusæ, sequi possunt.

Jecoris morbi ad hydropem inducendum
 trifariam conferre videntur.

I. Jecur mole auctum, venam cavam infe-
 riorem premendo, et in omnibus ejus ramis
 sanguinem

* *Conspect. Med.* § 424.

fanguinem cumulando, exhalationem adauget.

2. Hepar durum, fanguinique per venam portarum ferè impervium factum, coacervationem fanguinis talem in abdominis venis efficit, ut tenuior pars fanguinis per exhalantia impellatur, sequaturque hydrops, in primis quidem *ascites*.

3. Vitia denique hepatis diu provecta, assimilationem cibi depravando, aut respirationem impediendo, lapsum virium insignem, guidumque humorum motum, inducunt; et propter relaxationem corporis generalem, fontem quidem hydropis frequentissimum, ad hunc morbum gignendum pollent.

Hic tamen minimè celandum est, quod vitia hepatis ingentia sine ullo hydrope Medicis plurimis notata sunt. Dr REUMONT in Diff. sua Inaug. refert exemplum fœminæ insignis, ei a Profess. ROUGEMONT communicatum, cu-

jus

jus hepar 12 libras æquabat, et nodis steatomatosis obfitum erat, absque ullo hydrope*.

Tumores varii in abdomine fiti, cum lienis, ventriculi, pancreatis schirri, tum steatomata, hydropes saccati, ob eandem rationem, venas singulares premendo, hydropem producere possunt; sectionesque cadaverum hanc conjecturam confirmant.

Incisiones hydropicorum, a BONETO †, aliisque, memoratae, in quibus lienem solum vitiari detectum est, hujusce visceris morbos ad hydropem creandum valere, nos certiores faciunt. Dr D. MONRO etiam hydropici exemplum vidit, in quo lien post mortem schirrosus et hydatitibus obfitus, 126 uncias pendebat. Idem cel. auctor, ascitæ casum, originem suam ex ventriculo schirroso trahentis, memoravit: Plicæ ejus duræ, schirrosæ, prominentes, mi-
ris

* Vid. Diff. Inaug. de Ascite 1793, p. 16. Etiam exemplum aliud in RICHTER, Med. und Chir. Bemerk. b. 1. p. 268.

† BONET: loc. cit. Obs. 6. et 7. Cas. 4, 5, 6. 9.

ris modis convolutæ apparebant*. Hydro-
pici exemplum, observatu dignum, sed vix
credibile quidem, in SCHENCKIO legendum,
cujus lien xxiii. libras æquabat, quod his ver-
bis describit auctor; “ ecce procedit lien
“ maximus, latissimus, ita ut totum imple-
“ ret abdomen, suppressis intestinis et ventri-
“ culo †.”

Exempla hydropis duo, in libro infradiçto,
quibus steatomata causam dederunt, promul-
gantur ‡.

Pari ratione effusionem adaugent arteriarum
aneurismata, fœtus in utero, aquæ moles in

G

ascite,

* Treatise on Dropsy, p. 16.

Confer etiam HOFFMAN. oper. loc. cit. § 10.

† SCHENCK. Obs. Med. lib. 3. obs. 9. de Liene;
confer etiam, obs. 10. De Hydrope.

‡ Edin. Med. Essays, vol. iv. art. 30. et vol. vi.
art. 63. In SWIETEN. Comment. Aphorism 1239.
et in D. MONRO loc. citat, alia hujusmodi exempla
invenienda sunt.

ascite, hydropesque faccati. Polypus etiam in aliqua vena formatus, hydropem ad fines ejusdem genuit.

CAUSÆ GENERALES exhalationis auctæ fecundæ sunt eæ, quæ *sanguinis impetum in arteriis intendunt.*

Ex observationibus Doctoris RUSH *, et nuperimè Doctoris GRAPENGIESSER †, hydropem a nimio sanguinis impetu, corporisque plethorâ, nonnunquam oriri, verisimile esse videtur.

Omnes hydropes in tónicos et atónicos a clar. RUSH dividuntur. Dr GRAPENGIESSER hydropem plethoricum genus peculiare facit, duas species complectens, quarum altera hydrops plethoricus *acutus*, alteraque *chronicus* appellatur. Hæ duæ quidem easdem causas agnoscunt,

* Med. Inq. et Observ. vol. ii. p. 163.

† GRAPENGIESSER, Diff. Med. de Hydr. Pler. acut. in the Annals of Medicine, vol. i. art. 15. p. 176.

agnoscunt, eorumque signa gradu tantum, constitutionumque varietate ægrotantium, inter se discrepant. Hydrops acutus, nimirum, temperamentum compagine corporis firmiore insignitum, chronicus autem *phlegmaticos*, debilioresque, tentat. Eorum Medicorum locupletissimæ auctoritati oppugnare nolumus; in his autem regionibus, talis morbus, ut hydrops *acutus*, quantum audivimus, Medicis vix innotuit.

Doctores RUSH et GRAPENGIESSER sententiam suam de hujusce morbi existentia hisce principiis struunt.

Signa inflammatoria hydropi comites sæpè se adjungunt. Testante enim Doctore GRAPENGIESSER, viri compaginis robustæ firmiorisque, et ætate florentes, ab eo nonnunquam corripuntur. Pulsus etiam frequentiores, pleni, aliquando duri, observantur. “ This
“ kind of pulse (ait Dr RUSH) I have fre-
“ quently observed in every species of dropsy.

“ It

“ It is seldom otherwise in the beginning of “ hydrothorax.” Sin autem, nimiâ fluidorum quantitate vasa debilitata fuerint, pulsus, quamvis adhuc pleni, tardiores fiunt*. ZIMMERMANNUS de Hydrope isto loquens, qui vitam FREDERICI Regis PRUSSIÆ terminavit, pulsus fuisse plenum et fortem notavit. Morbi pectoris inflammatorii, testante iterum GRAPENGIESSER, hydrothoracem haud rarò antecedunt. Sanguis etiam detractus crustam inflammatoriam semper exhibet.

De natura hujusce morbi, sententiam istorum Medicorum stabilire videntur *juvantia* et *lædentia* in certis hydropum exemplis. Dr GRAPENGIESSER testimonio suo affirmat, remediis hydropum solitis adhibitis, speciem terribilem induere morbum. Tumores hydro-pici ad rupturam usque auferunt, sæpeque superveniunt, delirium, spasmi, et apoplexia. Aliquando autem epistaxis accedens, crisi morbi

* GRAPENGIESSER.

morbi feliciorē efficit. In hydrope plethorico acuto etiā, sanguine detractō, vel hæmorrhagiâ spontaneâ proficiente, respiratio paulò ante admodum laboriosa, nunc libera, pulsusque frequentes, parvi et duri, mirandum in modum, pleniores et fortiores evadunt. Fluxu sanguinis perstante, copiosior urina fluit, tumoresque hydropici mox effugiunt. Dr RUSK plurimos hydropes, remediis debilitantibus, quales sunt, diæta parca, jejunium, horrorque, sanatos memorat.

Sectiones denique cadaverum ex hoc morbo mortuorum, hydropis hujusce speciei naturam, in lucem protulerunt; et nihil his præstantius esse videtur ad naturam morbi cognoscendam. Aqua in cranio, thorace, et sæpè per totum corpus effusa, simul vasa majora sanguine turgentia reperta sunt. In specie acuta, inflammationes maximæ, spatiumque haud parvum occupantes, conspiciebantur*.

Pro

* GRAPENGIESSER.

Pro causis hydropis *plethorici* excitantibus, hæmorrhagiæ solitæ suppressæ, partium internarum inflammationes, exanthemata retro-pulsa, perspiratio obstructa, diarrhœaque subitò suppressa, a GRAPENGIESSER recensentur.

CAUSÆ ordine sequentes illæ sunt, quæ corpus *atoniam* faciendo, vasis exhalantibus effusionem adaugent.

Atoniam et corporis *relaxationem*, undecunque nascentes, fontes hydropis uberrimos, Medici uno ore recognoscunt. Anasarca in artibus paralyticis sese ostendens, ascites ista parturitioni in debilibus nonnunquam superveniens, (pressurâ foetus, nempe, vasis ex improviso sublatâ), hanc rem satis docent. Conditio corporis ista, causis debilitantibus genita, hydropique viam sternens, *diathesis hydropica* nominatur. Nonnunquam vero talis corporis conditio diu persistans eo usque ingravescit, ut sola, nullâ aliâ causâ adjectâ, justum et manifestum

festum morbum faciat * ; vel aliis hydropis causis, ut plenum suum effectum edent, apponi potest.

Ab omnibus vero fatis intelligitur, quam multiplices debilitatis causæ esse queant: Sequentes præcipuè memorandæ sunt.

Evacuaciones omnigenæ immodicæ, sanguinis præsertim ; diæta corporis jacturæ impar ; frigoris cum humiditate applicatio ; morbi diuturniores, veluti intermittentes febres, dyspepsia ; exercitatio vel labor violentus ; Venus nimia ; frequentissimèque ebriositas quotidiana, maximè ex liquorum ardentium abusu ; quæ omnia corpus debilitando, hunc diurnum morbum inducunt. Usus diurnum medicaminum astringentium, veluti Pulveris PORTLANDICI in podagra, morbum, de quo nunc sermo est, progenerasse dicitur.

CAUSÆ

* GREG. Conspect. p. 25.

CAUSÆ quæ sanguinem præter naturam attenuant, nunc in deliberationem cadunt.

Aucta sanguinis *attenuatio* hydropem per se inducere valet ; vel talis conditio aliis causis adjecta, ad morbum gignendum admodum confert.

Iste fluidus cava corporis irrorans, ob sanguinem minus solutum, tum ob vasa relaxata, languidèque renitentia, facilius et copiosius justo per exhalantia elabitur. Ex experimento pulcherrimo HALESI, patet, magnam aquæ vim in sanguine existentem, non ab arteriis in venas, sed potius per vasa exhalantia transfuentem in corporis cava deponi. Clar. SWIETENIUS HALESI experimentum his verbis citat ; “ dum pergebat per tubum carotidi arteriæ affixum aquam infundere, venis jugularibus quamvis secundum longitudinem fissis, non exivit libere aqua per has aperturas ; sed omnes corporis partes incipiebant tumere et fiebat universalis hydrops ; ubera
“ distendebantur ;

abfolvuntur, fluidaque exhausta in corpore retenta, in cavis diverfis deponuntur.

Caufæ fortuitò concurrentes ad hunc effectum haud parum conferunt. Hoc modo, aqua frigida avidè reforpta, corpore calente, vafa excretoria constringendo, hydropem derepentè genuit. Aqua etiam ex atmofphæra reforpta tenuitatem fanguinis adaugere poteft, eoque faciliùs, fi corpus relaxatum fit, et circulatio ad superficiem languefcat. Copia fluidorum ferè incredibile per has vias corpus intrare queat, ut clar. EDV. FORD experimento confirmavit. In fœmina hydrope ovarii laborante, (corporis pondere ad experimenti initium et finem æquali existente), fluida per urinam et paracentefin 18 fpatio dierum educata 1298 uncias, liquida in dicto fpatio per os affumpta 692 uncias folummodo æquabat; hinc patet, fluida per cutis et pulmonis superficies inhalata 606 unciis æqua fuiſſe*.

Pars

* Lond. Med. Comm. vol. ii. 1790:

Pars sanguinis aquosa præ cæteris exuberabit, cum excreta solita ab ulla causa suppressa fuerint. Hinc frigus et humiditas conjunctim corpori admota, perspirationem obstruendo, et sanguinem aquæ copiam nimiam suppeditando, suos effectus edunt. Urinæ secretionis diminutio, non solum pro effectu, sed quoque hydropis causa, sæpè habenda est. Nil dubitandum, quin aqua, quæ per has vias e corpore eliminanda, in cavis corporis diversis vel telâ cellulosâ deponi potest, solaque ad hydropem producendum, vel novum ei pabulum præbendum, conferat.

Exinanitiones sanguinis largæ vel sponte vel arte factæ, aqueam ejus partem, pro rata parte, maximè adaugent. Nemini enim ignotum, serositatem faciliùs, et multo ante gluten aut particulas rubras, reparari. Hinc quantitas multò citiùs qualitate sanguinis renovatur. Hinc serum exuberat, partes dum crassæ, quibus maximè valet sanguis, deficient. Oriuntur

ex crassarum partium inopia, vultus pallens, corpus debile, torpidumque, partes solidæ laxissimæ, tumoresque demum hydropici, viresque adèdè imminutæ, ut corroborantibus multis renovari non possint. Fonticuli largiores, et diurni, glutinis magnam copiam e sanguine abstrahentes, eodem modo, nocere videntur.

Fit porrò nimis tenuis sanguis assimilationis alimenti defectu. Concoctione enim depravatâ, quantitas partium crassarum, glutinis nimirum, et particularum rubrarum debita non paratur, serum adeoque abundat. Doctiss. SWIETENIUS his verbis de hac re sagaciter observat: “ Nec chylum possunt in bonum et
 “ firmum sanguinem mutare; hinc incipit
 “ deficere pars rubra,” (et gluten), “ in san-
 “ guine; et cum hæ partes omnium crassissi-
 “ mæ sunt, tota massa humorum in majorem
 “ tenuitatem degenerat, cachectica fiunt cor-
 “ pora, et si nimis attenuata fluida dissidentur
 “ de corpore, marasmus sequitur, si maneant

“ in

“ in corpore, in cavis accumulatur, fiuntque
 “ leucophlegmatia et hydrops*.” Propter
 causam supradictam etiam, effusiones hydro-
 picæ haud rarò *Chlorosin* comitantur.

PLATERUS † hydropis exemplum refert e
 vesica rupta, et BONETUS ‡ plurima e vesica
 aut renis erosione nascentia, memoriæ tradidit.

De *ruptura lymphaticorum* hìc breviter dis-
 ceptandum est.

Hæc vero hydropis causa est rarissima: vasa
 enim lymphatica sine ruptura mirificè distendi
 possunt, et LOWER experimentum ad hanc rem
 probandam attulit: “ quippe (dicit hic) pluri-
 “ mas oves hydrope pectoris defunctas dissecai,
 “ in quibus vasa lymphatica ita turgida et reple-
 “ ta ut nusquam magis ||,” &c. Quanquam au-
 tem hydrops ab hac causa rarò originem ducit,
 minimè

* V. SWIETENII Comm. vol. iv. aph. 1228. p. 190.

† PLATERI Praxeos lib. 3. cap. 3.

‡ Loc. cit. lib. 3. Sect. 21. Ob. 8. Cas. 2.

|| LOWER Tractat. de Corde, cap. 2. p. 126.

minimè tamen negandum, lymphatici rupturam in nonnullis exemplis morbum inducere posse. Si lymphaticorum rami, vel ductus ipse thoracicus, comprimantur vel obstruantur, quomodo eorum ruptura sequi potest, facilè intelligendum. Dr D. MONRO duo hydropis exempla citat, a ruptis lymphaticis nascentia. In altero, “ circa tertiam vel quartam verte-
 “ bram thoracis hominis mortui post para-
 “ centesin thoracis institutam, quâ exitus præ-
 “ bebatur largæ liquoris chylosi copiæ, fora-
 “ men inventum est, e quo, tanquam e fonte,
 “ chylosa materies effluxit*.” In altero,
 “ Puella nimium enixa dum onus sublevare
 “ tentaret brevi postquam hydropica devenit,
 “ ex punctura sæpiùs repetita effluxit semper
 “ materies chylosa †.”

Idem auctor, ductu thoracico canis vivi constricto, vel receptaculum chyli, vel lymphaticorum

* Diff. Inaug. e BASSII Obs. dec. 2. obs. 7.

† Mem. de l'Acad. Roy, des Scienc. 1700. 1710.

phaticorum ramos majores quosdam ruptos fuisse semper notavit *. MORTON puelli ascitici casum vidit, e cujus abdomine, dum vixit, ope paracentesis plurimas libras chyli lactescentis, dulcis, qualis in ipso ductu chyliifero reperitur, eduxit. Secto cadavere, pulmones sanos invenit, “ nisi quod in postica parte, “ glandulæ apparerent admodum numerosæ, “ eæque satis insignes et duræ, egregiam pressuram super ipsum ductum thoracicum facientes, fere qua parte venam subclaviam pertingit; erantque adeò insignis ponderis et molis, quod ob pressuram super ductum inde factam, ac si a fascia injecta difficile admodum videbatur, si omninò possibile, ut chylus sese in sanguinem trajiceret †.”

Extirpatis glandulis quibusdam, vel sectis vasis lymphaticis, in artubus oritur œdema, ut
cel.

* Loc. cit. p. 24.

† Phthisiologiæ, lib. 1. cap. 10. p. 21.

cel. BELL tradidit *. Glandulâ axillari extirpatâ, œdema brachii natum vidit clar. CRUICKSHANK; idemque SOEMERING † pluries se vidisse dicit.

Ex hisce omnibus factis constat, rupturam vaforum lymphaticorum inter hydropum causas enumerari debere.

De absorptione imminuta pro causa Hydropis restat ut pauca differamus.

ABSORPTIO e duabus causis minui potest.

1. E vaforum absorbentium atonia vel paralyfi.

2. E vaforum eorundam vel glandularum conglobatarum conditione morbida et obstructa.

1. E

* BELL's Syst. of Surg. vol. v. cap. 38. § 3. p. 502.

† De Morbis Vaforum Absorb. p. 129.

1. Vasa resorbentia, irritabilitate insigni, aut vi istâ, quâ, stimulo admoto, sese contrahant, et contenta sua ductum thoracicum versus impellant, prædita sunt. Structura fibrosa a præclaris anatomicis HEWSONIO * et CRUICKSHANKS demonstrata †, et vis contractionis, stimulis iis applicatis, ab HALLERO ‡ observata, naturam et vim musculosam in tunicis eorum inesse, nostro saltem iudicio, certissimè probant.

Corpori sano et morbofo absorptio longè diversa est. Valet dum corpus, functionesque diversæ validè peraguntur, si fortè fluidorum exhalatio crescatur, vasorum absorbentium vi pro rata parte auctâ, illico resorbetur aqua abundans, per serosa excretoria e corpore ejienda.

I Experimentum

* Exp. Inq. vol. iii. p. 121.

† Winterbottom, Inaug. Diff. in Thes. Med.

‡ HALLERI Element. Physiolog. tom. i. c. 2. f. 3.

Experimentum a MUSGRAVIO in cane institutum, a SWIETENIO citatum, hanc rem clarè monstrat ; “ per syphonem injecit uncias iv. “ aquæ calidæ in dextram partem thoracis “ canis vivi, unde difficultas respirationis sequebatur, et manifesta débilitas ; tamen successivè minuebantur hæ molestiæ, et septimanæ spatium æque sanum videbatur animal ac antea fuerat ; postea simili modo injecit “ 16 uncias aquæ calidæ in sinistrum thoracis “ cavum ejusdem canis ; respiratio erat difficilis, animal calebat admodum, et cor validè pulsabat : Intra septimanæ spatium “ convaluit canis. Postea in unum thoracis “ cavum aquæ calidæ uncias xviii. injecit, in “ alterum sex tantum ; eadem omninò symptomata sequebantur, sed citiùs evanescebant. “ Post quinque enim dies perfectè convaluit “ canis. Simul observavit, copiam urinæ solito majorem excrevisse hoc animal *.”

Si

* Comment. vol. iv. p. 129. e MUSGRAVIO in Phil. Trans. Abrid. vol. iii. p. 78.

Si corpus autem e sanitate firma admodum deflexerit, res longè aliter sese habebit ; corpus enim languescit, vires labuntur, vasa et sanguinea et absorbentia imbecilliter nitentia, tardè et vix contenta sua promovent. Vi contractionis in his vasis minutâ, vel prorsus deletâ, istum humorem, cava corporis, et interstitia telæ cellulosæ madens, resorberi nequit. Hæ vero causæ, quæ exhalantium relaxationem inducunt, ad vasa absorbentia etiam extendi possunt.

Ab eorum paralyfi, dilatatio, et in diametro amplificatio, (sagacissimo Professore RUTHERFORD testante), hinc ex necessario sequentur. Ab hoc aucto diametro, (ut solito acumine observat idem), valvulæ eorum vasorum muneribus minimè admissim funguntur ; e contrariò quidem, muscoli vicini sese contrahentes, vasa ad contenta sua propellanda non adjuvant, sed potius lymphæ regurgitationem faciunt. Gnarus etiam rerum anatomicarum, vasa absorbentia

forbentia in cadaveribus hydropicis contra valvulas suas injici posse, notavit*.

Hæc vasorum absorbentium dilatatio, in corporibus hydrope mortuis, anatomicis minimè latuit. Secundum enim MORGAGNI in multis hujusmodi exemplis “Lymphæductus” turgent in ventribus, adeo ut ramos amplificatos pennas equasse memoret †.

Plurima hydropum remedia, quæ contra hunc morbum aliquid pollere reperiuntur, ea sunt, quæ maximè ad augendam absorptionem, parumque ad exhalationem minuendam, conferre videntur.

CAUSÆ sunt multiplices, et variæ, quæ vasorum absorbentium capacitatem minuendo, vel glandulas eorum obstruendo, per utrumque lymphæ transitum impediunt.

Venenæ

* Prælect. Clinic.

† De Causis et Sedib. Morbor. Epist. 16. Art. 4. et Epist. 38. Art. 10. 13.

Venenæ diverſæ, quales ſunt cantharides e veficatorio, virus ex ulcuſculo venereo, vario- larum materies, abſorptæ, et per vaſa lymph- atica diffuſæ, tunicas eorum irritabiles inflam- mationi obnoxias eſſe, fatiſ monſtrant. Tali- bus enim irritantibus, ea adeo tument inflam- matione et indureſcunt, ut a parte unde acor iis ſorbetur in glandulas conglobatas continuas, digito premente, fat facilè diſtingui poſſint. Tunicis abſorbentium ita denſatis, hæc vaſa fluidis vix pervia evadunt.

Glandulæ conglobatæ etiam, æquè ac vaſa abſorbentia, haud rarò male ſe habent. Hæ partes enim, præter inflammationem, ſæpiſſi- mè ſchirro laborantes, mole augentur, indu- rantur, et omninò fere obſtruuntur. Vario- larum materie in brachium inſitâ, glandulæ ſub axilla frequenter tument, dolentque.

Licet vaſorum abſorbentium et glandularum conglobatorum obſtructionem inter hydropiſ cauſas enumeravimus, eam tamen rariffimè

hunc

hunc morbum inducere fatendum est. CULLENUS Peritiffim. de hac re multò dubitare videtur, cum ita dicit, “ As the lymphatics
 “ have branches frequently communicating
 “ with each other, it is not probable that the
 “ obstruction of any one, or even feveral of
 “ thefe, can have any confiderable effect in
 “ interrupting the abforption of their extre-
 “ mities.” “ And for the fame reafon, it is
 “ as little probable that the obstruction of the
 “ conglobate glands can have fuch an effect ;”
 “ and, accordingly, I have known feveral in-
 “ ftances of moft part of the mefenteric glands
 “ being confiderably tumefied, without either
 “ interrupting the tranfmiffion of fluids to the
 “ blood veffels, or occafioning dropfy *.”

A tali caufa tamen BONETUS † exemplum
 hydropis ab HARDERO ‡ citatum memoravit ;

“ ventris

* Firft Lines, p. 275. vol. iv.

† Loc. citat.

‡ Miscell. Curiof. 1672.

“ ventris tumorem asciticum cum tuberibus, e
 “ glandulis mesentericis induratis.” Alterum
 ejusmodi RUDNICIUS * his verbis protulit;
 “ hydropico observavi (ait ille) omnes glan-
 “ dulas infimi ventris, tam internas mesenterii,
 “ quam externas abdominis, induratas, impri-
 “ mis illas copiosissimè regioni lumbari in-
 “ cumbentes.” Attamen hæc causa fortasse,
 potius debilitando, quàm obstruendo, hydro-
 pem inducit.

CAUSÆ compressionis diversæ, quæ venas
 rubras premendo, exhalationem adaugent, eo-
 dem ratione ramos absorbentium afficientes,
 lymphæ transitum per eosdam impedire pos-
 sunt. SHERBIUS a diverso obstructionis fonte,
 concretione nempe in receptaculo chyli hæ-
 rente, exemplum memoriæ tradidit †.

P R O-

* Idem, 1673.

† HALLERI Disp. Med. tom. iii. p. 536.

P R O G N O S I S.

Mala inter innumera, homines quibus obnoxii sunt, quibusque defidia, luxuria, voluptas, cæteraque vitia sæculi nostri, ansam maximè præbent, eximius est dirus et sæpè immedicabilis hydrops : Prognosis ideo, in plurimis saltem exemplis, infelicissima !

De felice aut infelice morbi eventu præcipuè judicamus ;

1. Ex causarum notitia quæ morbum genuerunt ;

2. E temporis spatio per quod hydrops duraverit ;

3. Ex ætate, robore, et temperamento ægroti ;

4. E viscerum functionibus aquâ circumdata-
torum.

Si ægrotus ætate integrâ floreat, viribus parum fractis ; si causas sanabiles, veluti frigus, exanthemata rētopulsa, mēstruas vel hæmorrhoidem coërcitas, similesque, morbus agnoscat ; non parva spes salutis affulget.

E contrario autem, si ægrotus sit provec-tiore ætate ; si vitia organica, cordis, jecoris, pulmonifve, hydropi causam dederint ; si morbus diu perstiterit ; si tussis valdè ur-ageat ; si erecto cervice æger spirare cogatur ; si e prima somni blanditia, suffocatio-nis metu, subitò excitetur ; si dolores abdomi-nis gravissimi torqueant ; si horum omnia aut plurima adsint, periculi sunt plena, et mor-bum lethalem præfagiunt.

Hydrothorax ex impedita respiratione multo periculosior est ascite vel anasarçâ.

Minus terribilis est hicce morbus, cæteris paribus, si urinæ nec parcè fluant, nec fitis multùm urgeat ; si remedia idonea cum fructu

K

quodam

quodam administrentur ; si vires parùm deficient ; si pulsus fiant ferè naturales.

Auctores diversi sanationes inopinatas, a vomitu spontaneo *, ruptura umbilici †, singularis appetitûs indulgentia, meminerunt.

CURATIO.

Confilia medendi tria sunt ;

Primum est, causas remotas tollere ;

Secundum, aquas collectas educere ;

Tertium demum, morbi reditui obstare, totum corpori reficiendo.

Horum confiliorum, nunc primum, nunc secundum, præcipuum est. Ex indiciis urgentibus, præcipuè vero ex impeditis, propter partes aquâ distentas, functionibus vitalibus,

in

* Treatise on Foxglove. WITHERING.

† Monita et Præcepta Medica. MEAD.

Exemplum etiam in Edin. Med. Essays vol. iii.

Obs. 8. videndum est.

in primis respiratione, nonnunquam fit, ut aquam statim ad servandum ægrotum educere necesse fit. Paracentesi quoque, antequam consilium primum expleri possit, sæpè opus est. Porro, in nonnullis exemplis, propter aquæ pressuram super renes, vis diureticorum potentissimorum, donec aquæ pars saltem educatur, omninò impeditur. Utrumque etiam consilium eodem remedio sæpè felicissimè absolvitur; vel ex junctis medicamentis, et aquam exhaurire, et causas remotas amovere possumus. Ex gratiâ, si morbus ex perspiratione obstructa nascatur, sudorifica vel per se, vel cum balneo calido adjecto, utriusque consilio æquè interviunt. Si morbus viscerum male se habentium sequela fit, vitium organicum, hydrargyro solo, vel cum scilla juncto, discutatur, aquaque simul educatur.

CONSILIUM PRIMUM.

CAUSAS REMOTAS TOLLERE.

Si *hydrops* ex atonia et debilitate totius corporis, in primis exhalantium et absorbentium, nascatur; ad remedia corroborantia, unde pristinae vires reficiantur, recurrendum est.

Inter hujusce generis remedia, cinchona, ferrum, victus nutriens, vinum, frictiones, exercitatio, maximè valent.

Si status corporis contrarius, vis nempe vaforum aucta, (de quo supradictum est), adfit, remedia vaforum hanc vim minuentia, ut tollatur ea corporis conditio, e qua pendet *hydrops*, maximè idonea esse videntur.

Sanguinis detractio. Hoc quidem anceps est remedium, adeòque in hydrope maximâ cautione

tione utendum. Si conditio autem corporis jam memorata, vel topica inflammatio visceris internæ adfit, tutò et utiliter sanguis detrahi potest. Cel. HOFFMAN*, et Præclarus HOME †, sanguinis detractionem, in paucis exemplis, cum eventu morbi secundo, adhibuerunt. Hæmorrhagiæ ‡ sponte prorumpentes etiam, remediis diureticis, &c., prius frustra tentatis, ad sanitatem ægros reduxisse feruntur. Dr RUSH || hoc remedium in plurimis hydropibus maximè laudat, et semel ascitem, terque anasarcam, per missionem sanguinis se sanasse affirmat.

Dr D. MONRO § exemplum e SPONIO citat,
in

* Lib. citat. (Cap.) de Hydrope.

† Clin. Exp. on the use of Chryst. of Tart. in Dropsy.

‡ Vide exemplum in CRUICKSHANK on the Absorbents. Confer etiam GRAPENGIESSER, loc. cit.

|| Med. Inq. vol. ii. p. 170.

§ Loc. cit. p. 43. Confer etiam HILDAN. Observ. cent. 1. obs. 50.

in quo, sanguine vicies detractō, demum cessavit morbus.

Abstinētia a potu. Veteres hanc duram crudelemque praxin ad hydropem sanandum admodum necessariam esse putârunt. “ Inter
 “ initia (ait CELSUS) non difficillima curatio
 “ est, si imperata sunt corpori, quies, fītis, et
 “ inedia :” iterum, “ Potio non ultra dan-
 “ da est, quàm ut vitam sustineat *.”

Plurimæ autem curationes ab usu diluentium solo, aquis, verbi causâ, mineralibus largè exhaustis, a scriptoribus haud paucis memoratæ sunt. Diluentia quoque diureticis variis adjuvantia ad urinam ciendam magnoperè conducunt. Aquam, tanquam hydropis medicamentum, HOMIUS egreg. æstimat ; eique assentit CULLENUS, “ That there is hardly any
 “ diuretic more certainly powerful, than a
 “ large

* De Medicin. cap. 21. lib. 3.

“ large quantity of water taken in by drink-
 “ ing*.”

His perpenſis, concludere licet, non ſolùm potum non nocere, ſed plerumque in hydrope multùm prodeſſe.

Si cauſa mali remota ex viſceribus obſtruc- tis, exempli gratiâ, hepatis ſchirro, generetur, medicamenta quæ tales obſtructiones ſolvunt, præfertim *Hydrargyrus*, adhibenda.

Si ex liquoribus ardentibus largè uſis hydrops originem ſuam ducat, æger ſummâ curâ illos evitare debet. Si autem vires minuantur, et appetitus deficiat, aſſuetis potationibus intermiſſis, tunc “ non ſolùm ex malis eligere
 “ nos minima oportet, ſed etiam ex his ipſis
 “ excerpere, ſi quid ineſſet boni.” Hinc liquorum ſtimulantium uſus, quo vita brevi ſervetur, quantitate autem gradatim minutâ, concedendus.

Si

* Firſt Lines.

COUPER etiam MILLMAN de Hydrope.

Si scabies retropulsa, aut aliorum morborum qui cutem obtinent suppressio antecesserit, præter remedia ex antimonio et sulphure, veficantia, et similia, infitionem scabiei monet BURZERIUS*.

CONSILIUM SECUNDUM.

AQUAS COLLECTAS EDUCERE.

Sequentia huic rei inferviunt :

1. Cutis puncturæ et paracentesis ;
2. Ea Medicamenta quæ absorbentium vim augment, quibus fluidum effusum reforbeatür, reforptumque ad excretoria corporis vertatur.

1. Multi, veficatoria, fetacea, et incisiones, ad aquas anasarçæ educendas laudarunt.

Cum

* Infit. Medic. Pract. vol. iv. De hydrope pect. et pulmon.

Cùm autem notiffimum est, vulnera leviffima, tali in corporis ftatu, in *eryfipelate* et *gangræna* femper ferè definere, veficatoria et fetacea nunquam, incifiones raro, adhibere debent. Neque *puncturæ* quidem unquam agendæ, nifi propter magnam partium diftentionem ruptura, quæ vulnere fealpello facto periculofior fit, immineat.

Paracentefis Thoracis. Cùm hydrothorax (ut antea dictum est) certo et pathognomico figno fæpiffimè caret, fluctuatione in omni ferè exemplo abfente, paracentefis in thoracem, noftro iudicio, rariffimè adhibenda. Aft fine periculo certè fieri poteft, paucisque etiam exemplis, falutem adtuliffe fertur *. Si aquam igitur fluctuantem percipiat medicus (quod raro quidem accidit), fi indicia vehementiffima mortem instantem minantia adfint, remediis aliis fine effectu jam adhibitis, ad paracentefin

L thoracis,

* Vide in Phil. Tranf. vol. lvi. p. 302. exemplum feliciter terminatum a thorac. punctura.

thoracis, tanquam extremum remedium, recurrendum est.

Paracentesis abdominis. De ascitis studio, quo felicissimè fiat paracentesis, medici inter se magnoperè discrepant. Paracentesis sub initio morbi facta a FOTHERGILL * commendatur, eamque effectū carere morâ existimat.

Quoniam autem, paracentesi factâ, multò citiùs renascitur humor in ascite, et quoniam ægrotus miseram suam conditionem hinc magis sentit, nisi propter auctam distentionem immineat periculum, nostrâ quidem sententiâ, medicamenta, quæ ad aquam deducendam maximè conducunt, primùm administranda, nec paracentesis, nisi hisce frustra tentatis, adhibenda.

Injectiones quibus de reditu morbi caveatur a nonnullis propositæ sunt ; propter autem effectum

* FOTHERGILL'S Works. On the use of tapping early in dropfies, p. 283.

fectum incertum, et discrimen, rarò aut nunquam (quantum audivimus) tentatæ sunt.

Remedia interna, quæ aquæ deducendæ interserviunt, sunt *Emetica*, *Cathartica*, *Diuretica*, et *Sudorifica*.

I. EMETICA. Quia hydrops nonnunquam tollitur per vomitum spontaneum, emetica laudata sunt. Vomitum maximè absorptionem promovere res plurimæ testantur. CRUICKSHANK* hydropici tumoris genu exemplum narrat, quod, vomitione a casu factâ, ex improvîso evanuit. Alterum, nec minus mirabile, a celeb. HUNTERO memoratur, in quo, a nausea et vomitu ex navigatione genitis, pus in bubone collectum subito resorptum fuit.

SYDENHAMUS † usum *antimonii* ad vomitiones concitandas in hoc morbo multum approbat. Ex modo quem in *scilla* adhibenda Prof.

HOME

* Letter to Clare, p. 166:

† SYDENH. Opera, p. 494.

HOME * fecutus est, emeticorum vis in aqua corpore educenda magis adhuc confirmari videtur. Ex decem hydrope laborantibus septem convaluerunt, quorum finguli ex scillis exhibitis vomuerunt; tres autem non sani facti, quibus non ciebatur vomitus †.

II. CATHARTICA. Quoniam cathartica ab ægris hydropicis meliùs emeticis sustinentur, eorum usus frequentior est. Cathartica præ omnibus aliis medicamentis ad fluida serosa evacuanda maximè valent; et quoniam ea omnia, præcipuè vero draffica, corpus totum stimulando, absorptionem augent, inter remedia efficacissima ponuntur.

Inter varia medicamenta cathartica, quæ hydrope profunt, sequentia præcipuè enumeranda; gambogia, elaterium, colloquintida, scammonia, jalappa, rhamnus catharticus, iris palustris, cortex ebuli, plurimaque alia, quæ
singulatim

* Clin. Exp. p. 390.

† Ibid.

singulatim describere tædium fuerit. Cathartica, modò separatim, modò vero conjunctim, v. g. *gambogia* cum *calomelane* conjuncta, *jallappa* cum *chrystallis tartari*, utiliter administranda.

III. DIURETICA. Medicamenta quæ urinam movent ad aquas in hydrope educendas maximè profunt; “ Verissimum tamen est, “ (ait elegantiss. auctor Conspectûs), et maximè dolendum, eorum effectus adeo esse “ incertos, ut nemo medicus polliceri possit “ se ægro cuiquam per ulla medicamenta urinam esse moturum; sæpè enim quæ jure “ validissima habentur, urinam ne minimum “ quidem movent *.”

Omnia medicamenta diuretica in hydrope adhibita adeo numerosa, ut ægrè et sine fructu quidem recenserentur; satis habendum, ea quæ præcipua et potentissima, enumerare.

Diversa

* Conspect. Med. Th. vol. ii. p. 268.

Diverſa ſalina, ſicut acida mineralia, et vegetabilia, præſertim acidum tartaricum, ſales etiam alcalini, ſalesque medii, veluti lixiva nitrata, lixiva acetata, cæteraque multa, ad urinas ciendas plus minusve adjuvant; ſed longè præ aliis,

Chryſtalli tartari, vel tartaris potaſſæ acidulus. Poſt MANGHINI * celeberr. Prof. HOME †, ex plurimis experimentis in *noſtro Noſocomio* factis, virtutes hujusce medicamenti inſignes ſatis confirmavit. Veſtigia ſolertiſſ. HOME ſequens nuperrimè Dr FERRIAR ‡, ex periculis ejuſdam generis in Noſocomio MANCUNENSI, virium chryſt. tartari confirmationem ulteriorem præbuit. Ex his, hi medici ſagaces, ad hunc morbum tam ſæpè læthalem vincendum, inter præcipua et certiffima *Hydrogoga* hoc remedium rectè collocarunt.

Chryſtalli

* Mem. de l'Acad. de Bologne tom. iv.

† Clin. Exp. p. 378. et ſequ.

‡ Med. Hiſt. et Reflex. vol. i. et ii. Art. Remedies of Dropſy.

Chryſtalli tartari nonnunquam urinam movere, sæpè alvum ciere, a medicis jam dictis reperti ſunt. Hoc medicamentum autem tumores multo magis pro rata parte sæpè minuere, quàm evacuationes urinæ et alvi promovere, viſum eſt. Hinc obſervat Dr HOME plurima medicamenta, quæ potentiffima diuretica habentur, minimè ad aquas tantum educendas conferre. Ex hydropis exemplis xx. quibus Dr HOME hoc remedium exhibuit, xiii. convaluerunt. Teſtante eodem auctore, maximas vires in anafarca, minores in aſcite, minimas quidem in hydrothorace, edidit. Idem medicus, magnam vim ad obſtructiones, præfertim hepatis, removendas, chryſtallis tartari attribuit. Re ita ſe habente, primo et ſecundo conſilio in plurimis aſcitis exemplis maximè infervit hoc remedium.

Ut effectus ſuos medicamentum edat, in doſibus largis præbendum eſt. Drachmæ duæ vel tres ſingulis horis ad alvi ſolutionem, vel
ad

ad urinam emittendam, ex fyrupo tenui vel lacte ebutyrato, administrari debent. In quibusdam exemplis, cathartici ejusdem effectus, granis aliquot *gambogiæ* additis, aptè augeri possunt.

Tentamina chryftallorum tartari a Doctore FERRIAR facta, vires ejusdam valentissimas in hydrope haud parum comprobant. Ex ægris hydropicis enim 43 quibus medicamentum administratur, 33 horum sanati; 9 mortui; et tribus ab ejus usu factus est morbus mitior.

Hoc ex levi operatione remedium, multis aliis, quæ signa in corpore gravia gignunt, multò anteponendum. Ita enim curationem exercentur requiei consulentes ægrotantium, quæ, cum fieri possit, nunquam negligenda.

Scilla. Inter remedia diuretica, et antihydrica, nullum fortassè magis, quam *scilla*, ab omnibus ferè medicis, et recentioribus, et antiquioribus, laudatum est. Nec brevis huic fama ut aliis hujusce generis, sed per tempus longum

longum superstes, rapacem multis spoliavit mortem.

Scillam cum *nitro* junctam ad urinam promovendam commendat Dr WAGNER.

Dosis larga scillæ primùm vomitum efficit, abdomen tormine torquet, et cibi appetitus ab ea depravatur. Hinc in minimis dosibus et cum aromaticis juncta adhiberi debet.

Hydrargyrus quidem, nullo adjecto diuretico, vasa absorbentia stimulando, et excreta diversa augendo, absorptionem humoris efficit, absorptumque fluidum, per vias urinarias, vel per alvum, vel demum per glandulas salivares, e corpore pellit.

Hydrargyrus autem cum *scilla* junctus maxime prodest. “ Hoc autem certius (ait Prof. GREGORY) adhuc facit, si non solum datum fuerit, sed una cum alio medicamento, veluti *scilla*, quod id quasi ad renes dirigat.” Hujusmodi compositio et conjunctio medicamentorum,

“ camentorum, remedium diureticum omnium
“ ferè quæ hæctenus cognita fuerint efficacif-
“ simum præbet *.” Idem etiam experientiâ
doctus scillam, et hydrargyrum muriatum mi-
tem, sejunctim sæpè exhibet, hydrargyrum noc-
te, scillam luce. Somnus mercurii actioni ad
laticem resorbendum favet, aërque frigidus, et
exercitatio, fluidum ad renes dirigendos scil-
lam haud parum adjuvant.

Hydrargyrus quidem diureticorum ufui
viam sæpè sternit; namque idem medicus,
hydrargyro adeo ut os leniter afficiat admini-
strato, postea scillam melius respondere fre-
quentissime observavit.

Hydropi cum vitium organicum hepatis
lienifve causam dederit, hydrargyrus, vel ex-
ternè unguenti frictione, vel internè hydrar-
gyri muriati mitis formâ, fortiter et strenuè
adhibendus.

Digitalis

* Conspect. vol. ii. De remed. diuret. p. 372.

Digitalis purpurea. Hujusce medicamenti potentissimæ vires salutares ad hydropem, præsertim hydrothoracem prius ferè indomitum, debellandum, primus monstravit Dr WITHERING *. Hoc ab aliis eodem successu administratum nomen sibi magnum vindicaret. Eisdem felices tamen effectus (sicut infra ostendemus) haud semper probavit, quia forsitan sine solertia a medicis quibusdam adhibitum fuit.

Effectus vero maximè noxii, et molesti, in aliis exemplis medicos quosdam ab ejus usu deterruerunt. Dosis vel nimia, sæpiùsve repetita,

* Formûla WITHERING :

Dosis pulveris a gr. ss. ad gr. ii. vel. iii. bis in die sumenda.

℞ Folior. Digitalis ficcator. ʒii.

Aquæ bullientis, ℥s.

Infunde per horas quatuor ; et colaturæ adde

Spiritûs cinnamomi ʒi.

Hujusce infusi ʒi. bis in die sumenda.

Vide Treatise on Foxglove.

tita, nauseam, vomitum, hypercatharsin, vertiginem, pseudoblepsin, pulsum maximè tardum, sudores frigidos, spasmos, syncopen, demumque mortem, inducere solet. Ea mala autem, non medicamento ipsi, sed imperitiæ administrantis, sunt imputanda. Dr WITHERING hoc remedium primò præscribens tantum censebat præbendum, quantum nauseam et pulsum tardum inducebat. Citò tamen effectus diureticos adeo de viribus ejus narcoticis non pendere reperit; diuresis enim, supervenientibus nausæ, vomitu, aut pulsu tardo, in plurimis exemplis subito cessavit*.

Experientia tandem docuit Doctorem WITHERING, digitalem in parvulis dosibus, ita ut, nec ventriculus, nec pulsus afficerentur, adhibitam, ad urinam promovendam, et aquas collectas evacuandas, se optimè gessisse. Medicamentum igitur adhibere statim abstinit, cum ventriculum, aut pulsum, aut intestina, aut

renes,

* Lib. cit. Cases 72. 77. 101. 144. &c.

renes, affici primùm perceperit. Si purgatio supervenerit, multùm diminutam esse utilitatem notavit ; et, re ita se habente, opium ab eodem fuit felicissimè adjunctum.

De viribus digitalis in hydropem debellandum medici inter se magnoperè dissentiunt. Dr RUSH hoc remedio in hydropibus tonicis solummodo utitur, porròque dicit, “ I am
“ sorry to say, that after many trials, I have
“ failed in most of the cases in which I have
“ given it *.” Ex sententia autem Doctoris RUSH effectus ejus corpori inde debilitato adscribentis, hoc medicamentum in magna illa copia, quâ WITHERING infeliciter usus est, a RUSH adhibitum, nobis verisimile esse videtur. Digitalem præconceptâ etiam teoriâ de modo operandi talibus præscriberet Dr RUSH, quales etiam Dr WITHERING ex usu ejus minimè sanatos reddidit ; sicut his verbis traditur a WITHERING, “ In men of great muscular
“ strength,

* Med. Inquir. vol. ii.

“ strength, tense fibre, warm skin, florid complexion, and in those with a tight and cordy pulse.”

Pericula digitalis a Doctore FERRIAR in hydrope instituta observationes priores Doctoris WITHERING haud parum stabiliunt. Confitendum est tamen, effectus minus felices, quàm in exemplis a Doctore WITHERING traditis, usum ejus consecutos fuisse.

Ex observationibus Doctoris FERRIAR sequentia colligenda ; 1. Digitalem cautè, ut a Doctore WITHERING adhibitam, remedium tutum fuisse ; 2. Eam feliciter præbitam, mature et in dosibus parvis effectus suos edisse ; 3. Nausèâ, aut vertigine, aut pulsu tardo, supervenientibus, urinam minus movisse ; 4. Urinam in nonnullis exemplis, sine tumorum hydropicorum pro rata parte diminutione, auctam ; 5. Digitale ejus spes fallente, alium diureticum, et vice versâ, sæpè valuisse ; 6. E casibus xxix., xi. convaluisse, vii. mortuos, ii.

sublevatos

sublevatos fuisse, ix. nullam alleviationem morbi sensisse*.

A multis auctoribus observatum est, digitalem in hydrothorace præ cæteris hydropum generibus profuisse.

Plurimæ diversæque sententiæ de digitalis operatione in hydropem sanandum propositæ sunt; quorum multæ, repugnante experientiâ, haud veritate nituntur. “ Duo sunt præcipui medicinæ cardines, (ait BAGLIVI), ratio, et observatio; observatio tamen est filum ad quod dirigi debent medicorum rationum.” Theoria formata cum factis congruere semper debet; et “ quique (observat auctor jam dictus) de praxi per regulas Theoriæ promiscuè judicabit, nunquam felices eventus in curandis hominibus expectet †.”

Exemplis

* FERRIAR loc. cit.

† BAGLIVI Opera, lib. I. cap. 2.

‡ Ibid, lib. I. cap. 11. § 5.

Exemplis igitur perpenſis, quæ cel. medici WITHERING et FERRIAR attulerunt, minimè iis aſſentior, qui opinantur, digitalem naufeam et debilitatem producendo, motum abforbentium retrogradum gignere, et hinc tumores reducere; quia nunquam poſſet hypotheſis mera experientiæ repugnare. Sed non cenſendum, ubi naufea fit, ibi diureſin eſſe non poſſe; attamen in multis exemplis, naufea ſuperveniente, urinam prius plenè fluentem, ſubitò prohibitam, et tumores ultrà non diminutos, obſervatum eſt.

Ex omnibus ſupradictis, medicamentum, cùm eo rectè utimur, admodum utile in natura eſſe videtur, ex abuſu ejus tamen fit minimè utile, etiam pernicioſum. Modus operandi autem difficulter explicandus caligine fere omninò latet; ſed hoc quidem argumentum, indefinitum, incognitum, et fortaiſè inutile, prætermittere, et in CICERONIS verbis concludere nobis liceat: “ Quid ariſtolochia ad
 “ morſus

“ morfus serpentum poffit, video ; quod fatis
 “ eft ; cur poffit, nescio. Sic ventorum et
 “ imbrium figna, rationem quam habeant, non
 “ fatis perfpicio : vim et eventum agnofco,
 “ fcio, approbo *.”

Nicotiana †. Quanti pretii fit hoc reme-
 dium ad urinas ciendas a plurimis exemplis
 allatis

* De Divinatione, cap. 1. § 10.

† *Formula Nicotianæ* Doctoris FOWLER.

℞ Foliorum Nicotian. Virgin. ficcat. ℥i.

Aquæ bullientis, ℔ i,

Macera per horam unicam in vafe claufo, in balneo
 mariæ pofito, deinde hujus infufi ℥xiv. exprime, et
 colaturæ adde

Spirit. Vinos. Rectif. ℥ii. ut melius fervetur. Hu-
 jusce infufi lx. ad c. guttæ bis in die, fcilicet horis
 duabus ante prandium, et iterum horâ fomni, fu-
 mendæ.

Tinctura Nicotianæ.

℞ Folior. Nicotian. Virgin. ficcat. ℥i.

Spirit. Vinos. tenuioris ℔ i.

Macera per dies quatuor, et cola.

allatis testatus est Dr FOWLER. Eam præbuit hic hydropicis xxxi., quorum xviii. sanati, x. adjuvati, et iii. non levati sunt.

Ex 115 exemplis, in 93 *diuresis* promota ;
 in 40 alvus soluta ;
 in 79 vertigo inducta ;
 in 52 nausea genita fuit *.

Dr DUNCAN etiam experientiâ et diligentia præditus nicotianam in hydrope haud parum laudat †.

Opium. Hoc remedium, Doctore WILLIS testante, magnas laudes meretur. Dr MEAD etiam ægroto, quem dolores intolerabiles torquebant, cum maximo fructu, non solum in doloribus alleviandis, sed etiam in urinis ciendis, opium dedit ‡.

Virga aurea. In paucis hydropis exemplis Dr FERRIAR || hoc medicamentum feliciter administravit,

* FOWLER on the use of Tobacco in Dropsies.

† Prælection. Clinic.

‡ Monita et Præcepta Medica de Hydrope p. 21.

|| Lib. cit. vol. ii. p. 167. Cas. 20. 25.

administravit, in dosi pulveris ʒfs. ter in die id præbens.

Colchicum autumnale. Hoc medicamentum sub oxymellis forma exhibitum magnoperè laudant STOERCK et COLLIN. A multis autem aliis frustra administratum est, et remedium maximè anceps videtur.

Lactuca virofa. Vires diureticos haud debiles COLLIN huic remedio ascribit; in his regionibus autem medici, quibus virtutes ejus confirmarent, vix pericula fecerunt.

Multa alia medicamenta, de quibus singulatim tractare longum fuerit, a diversis medicis recensita sunt. Ex hoc numero, solanum (dulcamara), cuprum ammoniacum, pil. lunares, et pilulas tonicas BACCHERI, annotare fas fit.

Allium, cepa, semen sinapi, juniper, spiritus ætheris nitrosi, medicamenta diuretica potentiora ad suos effectus edendos maximè adjuvant.

Medicamenta

Medicamenta tonica cum diureticis juncta, veluti cinchonam cum cantharide, in nonnullis exemplis profuisse testatur Dr FERRIAR.

Fricationes manu cum oleo imbutâ minimè negligendæ : in morbis enim ab imminuta absorptione pendentibus haud parum profunt. Strigilis diu adhibita, nullis remediis internis adjectis, anasarcam removeere reperta est.

Sudorifica. Morbo a frigore et obstructa perspiratione originem ducente, *Pulv. Ipec. comp.* ad sudorem eliciendum, causâ hydropis hoc modo remotâ, nonnunquam cum fructu administratus est.

CONSILIUM TERTIUM.

TONUM CORPORI REFIGERE.

De consilio tertio, nempè ut hydropis reditui obstetur, haud multa dicenda. Omnia quæ
tonicum

tonicum corpus reddunt, sicut diæta roborans cum vini usu modico, exercitatio in aëre sicco et puro facta, balneum frigidum, medicamenta corroborantia, præcipuè *chalybs* et *cinchona*, diversaque amara, huic proposito sese offerunt.

Morbum quamvis adeo infestum depinximus, ex usu tamen tempestivo remediorum spes haud inutiles, causas amovendi remotas, indicia urgentia alleviandi, et fortassè morbi reditui præcavendi, habere liceat. Causæ autem sive hydropis diversæ, sive conditiones corporis contrariæ, in quibus hoc malum sese ostendat, spectantur, periculum ex iisdem remediis sine discrimine adhibitis pariter manifestum est. Hinc CAUSÆ hydropis EXCITANTES maximâ curâ perscrutandæ, et REMEDIA ad eas tollendas aptissima eligenda. Cura ad hanc rem necessaria uno alterove exemplo evincetur. In hydrope propter impeditam frigore perspirationem genito, balneum calidum, et medicamenta sudorifica, maximè pol-

lent.

lent. Quisnam, si ex obstructis vel schirrosis visceribus nascatur morbus, esset talium remedium effectus? Quanta mala ex stimulantibus in ea hydropis specie a Doctoribus RUSH et GRAPENGIESSER descripta, inflammatoriâ diatthesi comitante, auctâque arteriarum actione, sequerentur? Quam perniciofa, in corpore chlorosi debilitato, sanguinis detractio?

His demum peractis, restat tantùm, ut beneficia maxima, et plurima, a Professoribus in hac Alma Academia medicinam felicissimè docentibus, accepta, quæ in animo nostro nulla delebit oblivio, agnoscamus: itidemque Auctoribus, qui suppeditârunt huic opusculo materiem, gratiæ agendæ: magis enim aliorum adminiculis, proprio quàm Marte, hæc de morbo ferè indomito, quoad causas, symptomata, et remedia, potuimus conferre. “ Nec
 “ Medici, (secundum CICERONEM), nec Im-
 “ peratores,

“ peratores, nec Oratores, quamvis artis præ-
“ cepta perceperint, quidquam magnâ laude
“ dignum, sine usu et exercitatione, consequi
“ possunt*.”

* CICERO de Officiis.

F I N I S.

